

$$\begin{array}{l}
\text{(D C}^-) \quad \frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}} \cdot \frac{x^1 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}} = \frac{x^2 \cdot t^3}{x^2 \cdot t^3} \quad *D^{+-} = D_d^{+-} \\
\text{-----} \\
\text{(S}^- \text{ S)} \quad \frac{x^1 \cdot t^{4/3}}{x^2 \cdot t^{2/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}} = \frac{x^3 \cdot t^2}{x^3 \cdot t^2} \quad *\varphi^0 = \eta_s^0 \\
\text{(U T}^-) \quad \frac{x^1 \cdot t^{-1/3}}{x^0 \cdot t^{+1/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}} = \frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3} \quad *T^0 = T_u^0 \\
\text{(B}^- \text{ U)} \quad \frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}} \cdot \frac{x^1 \cdot t^{-1/3}}{x^0 \cdot t^{+1/3}} = \frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3} \quad *B^{+-} = B_u^{+-} \\
\text{(C}^- \text{ S)} \quad \frac{x^1 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}} = \frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3} \quad *D_s^{+-} = D_s^{+-} \quad = \text{⌘} = \text{axis} = \text{⌘} = \\
\text{(D T}^-) \quad \frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}} = \frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3} \quad *T^{+-} = T_d^{+-} \\
\text{(B}^- \text{ D)} \quad \frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}} \cdot \frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}} = \frac{x^3 \cdot t^4}{x^3 \cdot t^4} \quad *B^0 = B_d^0 \\
\text{(C C}^-) \quad \frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^1 \cdot t^{7/3}} \cdot \frac{x^1 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}} = \frac{x^3 \cdot t^4}{x^3 \cdot t^4} \quad *J/\Psi^0 = \eta_c^0 \\
\text{-----} \\
\text{(T}^- \text{ S)} \quad \frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}} = \frac{x^4 \cdot t^3}{x^4 \cdot t^3} \quad *T_s^{+-} = T_s^{+-} \\
\text{(S B}^-) \quad \frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}} = \frac{x^4 \cdot t^4}{x^4 \cdot t^4} \quad *B_s^0 = B_s^0 \\
\text{(T}^- \text{ C)} \quad \frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^1 \cdot t^{7/3}} = \frac{x^4 \cdot t^4}{x^4 \cdot t^4} \quad *T_c^0 = T_c^0
\end{array}$$

$$(C B^-) \quad \frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^1 \cdot t^{7/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}} = \frac{x^4 \cdot t^5}{x^4 \cdot t^5} \quad *B_c^{+-} = B_c^{+-}$$

$$(B^- B) \quad \frac{x^3 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^3 \cdot t^{7/3}} = \frac{x^5 \cdot t^4}{x^5 \cdot t^4} \quad *Y_b^0 = Y_b^0$$


$$(B T^-) \quad \frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^3 \cdot t^{7/3}} \cdot \frac{x^3 \cdot t^{10/3}}{x^2 \cdot t^{8/3}} = \frac{x^5 \cdot t^5}{x^5 \cdot t^5} \quad *B_b^{+-} = B_b^{+-}$$

$$(T^- T) \quad \frac{x^3 \cdot t^{10/3}}{x^2 \cdot t^{8/3}} \cdot \frac{x^2 \cdot t^{8/3}}{x^3 \cdot t^{10/3}} = \frac{x^5 \cdot t^6}{x^5 \cdot t^6} \quad *\Phi_t^0 = \Phi_t^0$$

některá liter. říká U^0

přejmenováno

□□ pozměnil jsem ZOEho označení Z^0 na ϕ^0



d	u	s	c	t	b	
$x^1 \cdot i^{2/3}$	$x^1 \cdot i^{-1/3}$	$x^2 \cdot i^{2/3}$	$x^2 \cdot i^{5/3}$	$x^3 \cdot i^{8/3}$	$x^3 \cdot i^{5/3}$	
$x^0 \cdot i^{4/3}$	$x^0 \cdot i^{-1/3}$	$x^1 \cdot i^{4/3}$	$x^1 \cdot i^{7/3}$	$x^2 \cdot i^{10/3}$	$x^2 \cdot i^{7/3}$	
BA	BB	BA	BB	BA	BB	- chut'

„Korálky“ kvarků se mohou >spřaženě< pohybovat po „sínusové niti“ a „nic se neděje“ – změna by se týkala pouze „přejmenování objektů“. Zřejmě budou kvarky v hadronech pouze aproximace „nepravidelných zhištěnin a zředěnin“ čili „chvění“ veličin tj. chvění – vlnění délky a času „převedené do sínusovek“ tedy chvění časoprostorové pěny na miniúrovních coby přeměna velkorozměrové plochosti vesmíru do kompakťikovaných křivostí v mikrosvětě, až natolik prováděného zakřívování, že toto se děje do vlnobalíčků z veličin délka a čas a tyto kompakťikované multidimenziovální „propleteniny vlastních dimenzí“ jsou hmotové artefakty. Sínusovka je ve válci „klesající přímkou“. Čili >linea< makrosvěta se „zakříví“, zakříví-li se i souřadnice souřadné soustavy, tedy obráceně : Bude-li pozorovatel v zakřivených souřadnicích (od globální gravitace), (např. ve válci, kuželu či paraboloidu...) pak se zakříví i „původní“ linea.

Špejlovou pyramidu jsem si doma postavil z tohoto grafu s úhly $60^0 - 60^0 - 60^0$, tedy i mezi osami \underline{x} a \underline{t}

Tab. 9 - mezonů je z "Úvod do unitární teorie Universa" pana D.J.Zoevistiana - originál


	\bar{d}	\bar{u}	\bar{s}	\bar{c}	\bar{b}	\bar{t}
d	η^0	π^-	K^0	D^-	B^0	T^-
u	π^+	π^0	K^+	D^0	B^+	T^0
s	\bar{K}^0	K^-	η_s^0	D_s^-	B_s^0	T_s^-
c	D^+	D^0	D_s^+	η_c^0	B_c^+	T_c^0
b	\bar{B}^0	B^-	\bar{B}_s^0	B_c^-	Y^0	T_b^-
t	T^+	T^0	T_s^+	T_c^0	T_b^+	Z^0

Tab. 9a - tabulka mezonů „Zoevistian“ tatáž, pouze >melodicky< upravená do sínusovky

	d^-	u^-	s^-	c^-	t^-	b^-	
d	η_d^0	π_d^{+-}	K_d^0	D_d^{+-}	T_d^0	B_d^{+-}	2/3
u	π_u^0	K_u^+	D_u^0	T_u^{+-}	B_u^0		- 1/3 --> „ $\pi(u)(o)$ důlek“
s		η_s^0	D_s^{+-}	T_s^0	B_s^{+-}		2/3

maticové uspořádání **varianta VI**

c
t
b



5/7

8/10 --> „ $\Phi(t)(o)$ vrchol“

5/7

↓
důlek

↓
vrchol

Z^0 u Zoevistiana je totožno Φ_t^0 u mě

